



**Catálogo
de Productos**

www.fagro.mx

**AGRICULTURA
SUSTENTABLE**



CONTENIDO

06 La Naturaleza
nos Habla

07 Cambiando el
Enfoque

08 Movimiento

10 Misión

11 Visión

12 Somos
Grupo Fagro

13 Clasificación de
Productos



Orgánicos



Reguladores
de crecimiento



Nutrición
vegetal



14 Aminofish

16 Bio-Film

18 Biomass SF

20 Blindax

22 Cinna-Mix

24 Mixsap-F



26 Organivir- K
(Virus Stop)

28 Biotech H3

30 Farmakin

32 Impulssor

34 Farmagib

36 Proroot



38 Green-Max
Green-Top

40 Fruti- K

42 Kelatop
(Calcio Boro)

44 Frutón K

46 Harderfol



En un mundo globalizado en donde la tecnología avanza a pasos agigantados y con el cuidado del medio ambiente como una premisa fundamental, el Grupo FAGRO INTERNACIONAL y FAGRO ECUADOR han decidido que su misión es buscar que el campo y la agricultura sean sustentables para las futuras generaciones.

No son simples palabras o conceptos que quiero plasmar en este texto, es el sentir y vivir de cada día; las experiencias en el campo junto a los agricultores, técnicos y amigos que son las que nos permiten como empresa desarrollar las mejores alternativas con productos de alta tecnología y calidad, siempre basados en una investigación seria y profunda de cada proceso.

FAGRO como empresa no busca vender solo productos sino gestionar relaciones serias y de largo plazo con nuestros socios comerciales y clientes; que el aporte técnico y comercial llene las expectativas de cada uno de ellos en todos los aspectos y sientan que siempre van a contar con nuestro apoyo.

Contamos con productos orgánicos certificados para los diferentes mercados a nivel mundial, nos especializamos en: línea de nutrición, control de plagas y enfermedades, inducción de resistencia, Bio-estimulación entre otras importantes en el campo y los cultivos, buscamos una Agricultura Sustentable pensado siempre en el medio ambiente, la satisfacción de necesidades del Consumidor y beneficios para El Agricultor.

Queremos una agricultura perdurable en el tiempo, porque es nuestra PASIÓN.

Ing.Quim. Rusbel Coronel Vásquez Msc
DIRECTOR
FAGRO ECUADOR

La Naturaleza
nos Habla

HOY

Hambruna y
campo

Demanda de
frutas y verduras
todo el tiempo

Globalización
de alimentos

40%
del empleo está
en el campo

Escasez
de Agua

El cambio podría
afectar el
20%
de la producción
agrícola

La agricultura
consume el 70%
del agua dulce
40% del empleo está
en el campo

1 de 3
personas viven
en un país con
escasez de agua

1000
millones de
hambrientos

MAÑANA

2025

el 30% de la producción de
cultivos estará en riesgo por
escasez de agua

2050

seremos 9 millones
de habitantes

Población
mundial

2050

habrá 60% menos
tierra cultivable por
personas que en 1972

2030

escasez de agua casi para la
mitad de la población

Escasez de tierra

Escasez
de Agua

INNOVACIÓN

**Cambiando el
Enfoque**

**QUÍMICA
SINTÉTICO
TOXIDAD**

**BIOLÓGICO
NATURALEZA
SOSTENIBILIDAD**

**NUEVAS Y MAYORES
REGULACIONES
AMBIENTALES**

**BIOBASADOS,
PRODUCTOS
PLÁSTICOS DE
MATERIALES
RENOVABLES**

**PRODUCTOS
BIOLÓGICOS**

**SE BUSCA LA
PROHIBICIÓN DE
AGROQUÍMICOS**

**MANEJO DE RESISTENCIA
REDUCE LA RESISTENCIA**

**MAYOR SEGURIDAD
ALIMENTARIA;
TRAZABILIDAD E
INOCUIDAD
ALIMENTARIA**

**MENOS
RESIDUOS**

**INCREMENTO EN
RENDIMIENTO Y
SANIDAD**



MOVIMIENTO

**“No es el más fuerte ni el más
inteligente aquel que sobrevive,
sino el que sabe adaptarse al cambio”**

Charles Darwin 1809,1882



VIVIENDO LA TRANSICIÓN

MISIÓN

EN GRUPO FAGRO, INNOVAMOS, PRODUCIMOS Y COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS DE BAJO IMPACTO Y RESIDUO CERO PARA FACILITAR A LOS AGRICULTORES A ALCANZAR UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE A TRAVÉS DE ECOTECNOLOGIAS QUE CONTRIBUYAN A UNA ALIMENTACIÓN SANA Y UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO.





VISIÓN

SOMOS LÍDERES EN **IBERAMÉRICA** EN EL MUNDO DEL **BIOCONTROL** Y LA **BIOESTIMULACIÓN**, POR EL ÉXITO ALCANZADO EN EL **DESARROLLO DE ECOTECNOLOGÍAS**.

OFRECEMOS SOLUCIONES PARA UNA **AGRICULTURA SUSTENTABLE** EN ARAS DE PRODUCIR ALIMENTOS SANOS, EMPLEANDO **MENOS RECURSOS NATURALES** Y SIENDO UNA EMPRESA **SOCIALMENTE RESPONSABLE**.



PRODUCTOS



ORGÁNICOS

**REGULADORES DE
CRECIMIENTO**



**NUTRICIÓN
VEGETAL**



Amino^{fish}

Fertilizante Líquido Proteína



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

AMINOFISH® es un Biofertilizante, a base de compuestos orgánicos, formulado a base de extractos solubles de pescado, que aporta un complejo de macro y micronutrientes, aminoácidos, aceites esenciales y proteínas, que son rápidamente asimilables y que promueven un buen desarrollo de la planta.

La presencia de grupos funcionales, hacen de Aminofish® un producto que actúa en sinergia con otros elementos, al facilitar su absorción y penetración a la planta.

Modo de acción:

Aminofish® activa en la planta los procesos fisiológicos de su metabolismo tales como el transporte de fotosintatos, activación enzimática y activación de mecanismos de defensa, también participa con la aportación de elementos nutricionales importantes en etapas de floración y fructificación.

Beneficios:

- * Incrementa la resistencia al estrés.
- * Evita el consumo excesivo de energía y reservas.
- * Regenera los tejidos vegetales.
- * Fortalece a la planta contra el ataque de hongos y plagas.
- * Mayor desarrollo.
- * Mejora los niveles de clorofila.
- * Aumenta productividad.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Proteína	20.00%
Zinc (Zn)	00.50%
Manganeso (Mn)	00.50%
Óxido de magnesio	
(MgO)	00.41%
Molibdeno (Mn)	00.02%
Hierro (Fe)	00.05%
Cobalto (Co)	0.005%
Acondicionadores	
inertes	78.515%
TOTAL	100.00%

Recomendaciones de Uso:

AMINOFISH® Puede aplicarse vía foliar. La aplicación foliar del producto debe ser preferentemente en las primeras horas del día o bien por la tarde, después de las horas de intenso calor, para favorecer la permanencia y absorción del producto sobre las hojas y demás órganos aéreos de las plantas.

CULTIVO	DOSIS L/Ha	INTERVALOS DE APLICACIÓN
Piña (Ananascomusus)	1-2L/Ha en semilleros	Después de herbicidas
Papaya (Carica papata)	500cc - 1L/Ha	15 a 21 días o después de un estrés de intoxicación
Banano (Musa spp)	500cc - 1L/Ha	Cada 15 días
Arroz (Oryza sativa)	1L/Ha	Aplicar al amacollamiento y al llenado
Maíz (Zea mays L)	1L/Ha	Cada 20, 30 y 40 días
Hortalizas	1L/Ha	Cada 15 o 21 días
Ornamentales	1L/Ha	Cada 15 días
Cacao (Theobroma cacao L)	500cc/Ha	Cada 15 días





Bio-Film®

**Coadyuvante - Dispersante - Antie vaporante
Protección UV**



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

BIO-FILM® es un producto natural derivado de la resina de pino, no tóxico para organismos vivos.

BIO-FILM® es coadyuvante no iónico. Actúa formando una película pegajosa que protege al plaguicida prolongando su permanencia en el follaje. Además **BIO-FILM®** reduce la evaporación del agua y disminuye la degradación de los plaguicidas. Por lo que es reconocido como un excelente extendedor y regulador de la vida útil de éstos.

Beneficios:

- * Disminuye la tensión superficial de la solución que se asperja logrando una mayor cobertura.
- * Forma una película insoluble sobre el área de contacto evitando el lavado y la evaporación.
- * Ayuda en la penetración y dispersión de los productos aplicados.
- * Mayor adherencia de los productos aplicados.
- * Al secarse forma una lámina elástica, creando un encapsulamiento de las partículas de los tratamientos, las cuales se liberan con lentitud en lo que se degrada de manera natural la película.
- * Suaviza la cutícula favoreciendo la penetración de los productos aplicados.

* Entre la parte exterior de la lámina formada y la inferior que está en contacto con el tejido se desarrolla una fase semilíquida que permite que el producto siga penetrando en la planta.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Pinenos	95.00 %
Emulsificante	5.00 %
Total	100.00 %

Recomendaciones de Uso:

DOSIS L/Ha	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
0.2-0.4 L/Ha	Banano. En aplicaciones aéreas con bajo volumen de agua
0.3 L/Ha	Aplicaciones convencionales para incrementar la eficiencia de aspersiones de insecticidas, fungicidas y herbicidas.
0.25-0.3 cc/L	Cuando se aplique en banano y en mezclas con insecticidas para control de insectos

- * Haga una pre mezcla con agua.
- * No colocar en el tanque directamente.
- * No mezcle con las manos.
- * Lave perfectamente el equipo luego de su uso.
- * En caso de evaporamiento utilice kerosene para eliminar residuos.

En el caso de bajo volumen de agua, para una buena emulsificación hacer una mezcla previa de **BIO-FILM®** con agua antes de que se agregue al tanque. El tiempo límite antes de la cosecha en que puede darse la última aplicación esta regido por los productos con los que se aplique porque **BIO-FILM®** está exonerado de residuo de cosecha. La actividad de este producto no depende de la cantidad de ingrediente activo en la formulación sino del tipo de película que se forme.





BiOMASS[®]SF

INOCULANTE BIOLÓGICO

FUSY[®]VERT
INOCULANTE BIOLÓGICO

Inoculante Biológico



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

BIOMASS-SF® elaborado a base de productos naturales de origen vegetal y marino, actúan en sinergia; aportando nutrientes, reguladores del crecimiento vegetal, ácidos orgánicos, además proveen una combinación de microorganismos y complejos enzimáticos, con capacidad de controlar un amplio espectro de enfermedades en los cultivos, causadas por hongos tanto en la raíz y tallo como en la parte foliar.

Beneficios:

* Favorece directa e indirectamente la absorción de nutrientes por la raíz, promueve un buen equilibrio del microambiente en la rizósfera y una regeneración de las poblaciones naturales de microorganismos benéficos del suelo. Induce los mecanismos de defensa de las plantas, desfavorece significativamente el ambiente y condiciones para el desarrollo de enfermedades y de nemátodos.

Composición

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% UFC/ml

Trichoderma sp 2.9x10⁸

Bacillus subtilis 6.5x10⁸

Recomendaciones de Uso:

COMPONENTE	EFFECTOS	MECANISMOS
Bacillus subtilis	Control de hongos fisiopatológicos y promoción del desarrollo de la planta, mejora disponibilidad y solubilidad de P, Zn y Mn	Compiten por espacio y alimento Síntesis de compuestos tóxicos y reguladores
Trichoderma harzianum		
Algas marinas	Mejora suelos, promueven crecimientos, desarrollo y resistencia	Citocininas, proteínas, giberelinas y auxinas
Ácidos Fúlvicos y Materia orgánica	Acondiciona rizósfera, mejora disponibilidad de nutrientes, humedad y penetración del agua	Absorción y transporte de iones y moléculas

CULTIVO	PATOGENO	DOSIS
Melón, Sandía, Pepino	Cenicilla, vellosa, Mildu, Botrytis sp.	500cc/Ha realizar las aplicaciones con 390 L de agua por Hectárea
Banano	Sigatoka negra, Nemátodos	0.5L/Ha 3L/Ha
Ornamentales	Varios	4 cc/Ha
Pitahaya	Fusarium	3 L/Ha

- Con su contenido de complejo bacterial protege las raíces de las plantas.
- Libera enzimas que inhiben el desarrollo de estos patógenos en la rizósfera.
- El extracto botánico actúa como insecticida repelente, antialimentario y larvicida contra nemátodos.

Incompatibilidad

BIOMASS-SF® es compatible con la mayoría de productos orgánicos e insumos comunmente empleados en el manejo de cultivos, sin embargo se sugiere inyectarlo solo en el agua de riego o con soluciones preparadas tal y como se indica en las instrucciones y en aplicaciones foliares, evitar el uso de Cobres, Azufres y Bactericidas.

Fitotoxicidad

BIOMASS-SF® no contiene agentes fitotóxicos ni causa efectos negativos a las dosis y formas de aplicación recomendada.

Modo de acción sobre Nemátodos

- Altera la permeabilidad de la membrana, provocando un desequilibrio en el metabolismo interno del nematodo.
- Bloquea además el suministro de sustancias para su desarrollo.





BLINDA^X

Fungicida CE
Inductor de Resistencia, Vacuna Vegetal
Bioestimulante.



ECUADOR

MÉXICO



Descripción:

Inductor de resistencia a base de compuestos orgánicos, es una nueva alternativa para el control y resistencia de los cultivos al ataque de hongos fitopatógenos y plagas que afectan la parte aérea de las plantas.

Debido a su composición única e integral, **BLINDAX®** ofrece la más amplia protección a enfermedades aéreas, activa de manera inmediata e intensa los mecanismos fisiológicos de defensa que poseen las plantas y variedades cultivadas, tanto en hortalizas, granos, cereales, frutales y cultivos industriales.

Los mecanismos de defensa que BLINDAX® activa son los siguientes:

- * Detección de invasores y respuestas hipersensitivas al daño y las heridas.
- * Emisión de señales bioquímicas para la síntesis de proteínas, fitoalexinas, compuestos aromáticos, peróxido de hidrógeno, reguladores de crecimiento y sustancias en lo general relacionadas con los mecanismos de defensa a plagas, patógenos y alteraciones ambientales.
- * Translocación de los compuestos de defensa a la zona afectada para matar y cicatrizar el tejido dañado, evitando el avance o supervivencia de invasor.
- * Ajustes osmóticos y modificaciones morfológicas (grosor de la cutícula, apertura y cierre de estomas, grosor de las paredes celulares, formación de zonas pubescentes, tricomas, y hasta el desprendimiento de órganos, etc.).

* Disminución de la tasa de crecimiento y desarrollo de la planta para reducir riesgos a la supervivencia.

* Reforzar los tejidos de los órganos de las plantas provocando una acelerada cicatrización en aquellas partes dañadas.

* Induce la síntesis de quitinasas y proteinasas, causando de manera directa algunos índices de mortalidad de los insectos.

* Fomenta la liberación de compuestos aromáticos relacionados con la señal de ataque de insectos en el tejido y sirve como atrayente de insectos benéficos, predadores.

Tizones	Cenicillas, Mildius, Royas y Fumaginas	Machas foliares
Phytophthora infestans	Peronosporas	Corynespora sp
A/ternaria sp	Erysiphe / Sphaerotheca / Uncinula	Cladosporium sp
Septorias sp	Capnodium spp.	Colletotrichum spp
Cercospora spp	Puccinia y otras Royas	Choanephora spp
Botrytis cinerea		Mycosphaerella spp
Sigatoka Negra	Mycosphaerella Fijensis	

Composición:

ANÁLISIS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% POR PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

2, D-Limonene	44.38 g/L
(Equivalente a 28.38g de l. A/L a 20 °C)	
Cis-jasmonato.....	4.24 g/L

Dosis de forma y aplicación:

(En forma preventiva y protectante)

Con el empleo regular de dosis bajas de **BLINDAX®**, se logra que la planta esté lista para contrarrestar cualquier eventualidad biológica o ambiental durante su desarrollo.

- I.- Ornamentales: 1cc de BLINDAX®/ L de agua
- II.- Banano: Aplicar de 400 - 500 cc/Ha
- III.- Piña: 500 cc/Ha con 5 días de intervalo la repetición
- IV.- Arroz y Maíz: Aplicar 500 cc/Ha
- V.- Cacao: Aplicar de 350 a 500 cc/Ha
- VI.- Papaya: Aplicar 500 cc/Ha





CINNA-MIX®

Insecticida CE



ECUADOR



MÉXICO

Descripción:

CINNA-MIX® es un producto Insecticida-Repelente-Acaricida de amplio espectro de acción y de origen orgánico, basado en un importante grupo de componentes derivados de extractos vegetales y aceites esenciales, provenientes de plantas cultivadas, silvestres, tropicales y del desierto; los cuales proveen a los cultivos de protección contra un importante grupo de plagas que causan bajas potenciales en los rendimientos de los cultivos.

CINNA-MIX® no provoca resistencia de los insectos a sus componentes, ni contiene compuestos cuyo uso no sea permitido por las normas nacionales e internacionales, ya que todos sus componentes son empleados en los sectores alimenticios de medicina humana y natural; además son considerados por la EPA ("Environmental Protection Agency", Agencia de Protección Ambiental), y FDA ("Food and Drug Administration", Agencia Federal de Alimentos y Drogas de Estados Unidos de América) como GRAS (Generalmente reconocidos como seguros).

Beneficios:

* Aumenta productividad.

CINNA-MIX® actúa de manera integral sobre la planta y la plaga activando a través de sus compuestos, una respuesta inmediata y adicional de las plantas en sus mecanismos fisiológicos de defensa, además de actuar multifuncionalmente sobre los insectos provocando:

* Reducción de la población de insectos.

* Problemas motrices, respiratorios y del sistema nervioso.

* Problemas alimenticios del insecto.

* Degradación del exoesqueleto del insecto, propiciando la exposición y muerte del mismo.

Composición:

INGREDIENTES:

% POR PESO

Trepenos de Naranja

(Citrus sinensis L)

D-Limonene..... 28.38 g/L

Recomendaciones de Uso:

* Poner en una cubeta, agua y el producto a la dosis recomendada.

* Agitar hasta lograr una mezcla uniforme.

* Agregar la solución lentamente y con agitación al tanque de aspersión, pero sin dejar de agitar.

* Llenar con agua hasta obtener el volumen total y la concentración deseada.

* Agitar constantemente para obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

* Calibrar el equipo de aplicación.

* **Cinna-Mix®** es compatible con otros productos que se aplican regularmente a los cultivos, aunque se sugiere aplicarlo preferentemente solo, para alcanzar los mejores resultados. Su solubilidad es excelente. Se recomienda acidificar la misma a un pH de 5.5 a 6.0 para lograr mejores resultados.

Cultivo	PLAGA	DOSIS L/Ha	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Arroz	Hydrelia	2.5-3.5 cc/L	Semanal
Pitahaya	Trips	3.5 cc/L	Semanal
Banano	Trips	2.5 cc/L	Enfunde Deschive 8 días Posteriores
	Trips Cochinilla	3.5 cc/Ha	Cuando se requiera
	Ceramidia	0.5 0.4cc/Ha	Una aplicación
Ornamentales	Pulgon Minadores	3.5 cc/L	Semanal
APLICACIÓN FOLIAR			





Bioestimulante y Antioxidante Natural



ECUADOR



MÉXICO

Descripción:

MIXSAP-F® es un producto 100% natural, elaborado a partir de extractos de origen vegetal, animal y marino, los cuales aportan nutrientes, azúcares, proteínas, enzimas, hormonas, vitaminas, ácidos orgánicos, antioxidantes, compuestos de defensa y otros compuestos orgánicos que las plantas requieren para terminar su ciclo de vida .

Beneficios:

* Actúa de manera general sobre los diferentes niveles de metabolismo y órganos de la planta, reforzando de manera inmediata sus reservas de alimento.

*Provee un importante complemento de los principales compuestos requeridos en las etapas de máxima demanda de alimentos y reservas de la planta, así como en las etapas fenológicas críticas que determinan el rendimiento.

* Proporciona un excelente soporte cuando las plantas se encuentran expuestas a niveles de humedad y temperatura extremos, que no les permiten mantener la demanda de metabolitos que se requieren para un crecimiento activo, en términos de intensidad, velocidad y calidad de los órganos y tejidos.


Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno total	1.00 %
Boro (B)	0.23 %
Cobre (Cu)	0.25 %
Zinc (Zn)	1.00 %
Ácido cítrico	3.50 %
Ácido Fólvicos	11.00 %
Materia orgánica	18.00 %
Polisacáridos	0.9 %


Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Sandía, Melón	0.5 L/Hacada 15 días	Aplique foliamente, la formación de las guías o inicios floración
Papaya	0.5 L/Hacada mes	Realice aplicaciones mensuales durante toda la etapa productiva y quincenalmente cuando la competencia en la planta es mayor, así como en situaciones de mayor estrés ambiental y ataque de patógenos
Banano	0.5 L/Hacada mes	Realice aplicaciones mensuales durante toda la etapa productiva y quincenalmente cuando la competencia en la planta es mayor, así como en situaciones de mayor estrés ambiental y ataque de patógenos
Aguacate, Mango y Cítricos	1 L/Ha	Aplique foliamente, enfoque las aplicaciones al momento de floración, amarre y desarrollo inicial de frutos.
Tabaco	0.5 L/Ha	Aplicaciones foliares, cada semana

Cuadro 1. Prueba de separación de medias de la altura de la planta de calabacita a los 15 días después de la segunda aplicación (DDSA) del producto **MIXSAP-F®**



Cuadro 2. Prueba de separación de medias del número de flores por planta de calabacita a los 20 días después de la segunda aplicación (DDSA) del producto **MIXSAP-F®**



Tratamientos con la misma letra son estadísticamente semejantes. Nivel de significancia - 0,05





ORGANIVIR-k

VIRUS STOP

Complejo Inductor de Resistencia
Anti-viral en Plantas



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

ORGANIVIR-K[®] es el producto alternativo más completo y moderno para lograr una mayor resistencia y tolerancia al ataque, diseminación y daños provocados por virus en los cultivos. El producto está enfocado para su aplicación en los principales cultivos frutales y hortalizas de mayor importancia comercial.

ORGANIVIR-K[®] integra una amplia gama de componentes relacionados con los mecanismos naturales que han desarrollado las plantas y variedades resistentes a virus. Muchos de sus componentes son de origen natural, muy seguros y permitidos para su uso incluso en el área de medicina humana y que no tiene restricciones para su empleo en la agricultura conforme a la normatividad internacional vigente.

Beneficios:

*Disposición de callosa, síntesis de lignina y fitoalexinas para sellar las regiones de infección del virus.

*Producción y utilización de los agentes de resistencia sistémica adquirida (Salicilatos, proteínas antioxidantes, etc.).

*Acción repelente e insecticida para insectos chupadores.

*Limpieza de estiletes de insectos chupadores.

*Síntesis de compuestos inductores de resistencia.

*Reactivación del crecimiento de la planta en zonas no infectadas.

*Síntesis de quitinasas.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Materia orgánica.....	33.00 %
Potasio (K ₂ O).....	5.00 %
Ácido salicílico.....	5.00 %

Recomendaciones de Uso:

ORGANIVIR-K[®] actúa tanto de manera preventiva como correctiva.

Se sugiere llevar a acabo un programa de aplicaciones continuas, semanales ó quincenales de baja dosis para mantener una protección continua desde que las plantas son pequeñas.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Papaya, Melon, Sandía, Tabaco		
Plantulas	Aplique de manera foliar 50cc/L	Semanalmente
Plantas jóvenes en campo o invernadero	Aplique de manera foliar 150 cc/HA	Semanalmente
Plantas desarrolladas en etapa vegetativa	Aplique de manera foliar 250 cc/HA	Semanalmente
Plantas en formación y fructificación	Aplique de manera foliar 300 cc/HA	Semanalmente
Plantaciones con presencia de insectos chupadores	Aplique de manera foliar 300 - 400 cc/Ha	Semanalmente
Frutales (Papa y Citricos) Y Hortalizas (Tomate, Sandia y Melon)		
Plantaciones con primeros síntomas de Virosis	Aplique de manera foliar 500 cc/Ha	Continuar con 500mL semanales


Cambios estructurales:

Raíz día 3

TA




VIRUS-ST OP



Tallo día 3

TA



VIRUS-ST OP





Regulador Orgánico de Crecimiento



MÉXICO



Descripción:

Biotech H3, es un regulador de crecimiento a base de fitohormonas naturales producidas por cultivos de microorganismos específicos; además de macro y microelementos provenientes de fuentes orgánicas.

Beneficios:

* Su formulación balanceada, aplicada en todos las etapas fenológicas, permite al cultivo expresar su máximo potencial genético, reflejándose en mejores y más cosechas, sin desbalancear hormonal ni nutricionalmente a la planta.

* Las Giberelinas en Biotech H3 incrementan el crecimiento en los tallos, interrumpen el período de latencia de las semillas, haciéndolas germinar; y movilizan las reservas en azúcar.

* Las auxinas contenidas en Biotech H3 promueven el crecimiento y diferenciación celular, y por lo tanto el crecimiento en longitud de la planta, estimulan el crecimiento y maduración de frutos, promueven la floración, evitan la senectud, evitan el geotropismo, promueven el desarrollo de la rizósfera.

* Las citocininas en **Biotech H3** estimulan la germinación de semillas, la formación de frutas sin semillas, promueven la ruptura del letargo de semillas, inducen de la formación de brotes, mejoran la floración, incrementan el crecimiento de frutos y rompen la dominancia apical de la planta.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno (N)	0.30 %
Calcio (Ca)	0.50 %
Zinc (Zn)	1.00 %
Magnesio (Mg)	0.50 %
Ácidos giberélicos	0.10 %
Ácidos indolacético	0.05 %
Citoquininas	0.015 %
Aminoácidos totales	0.01 %
Materia Orgánica	1.00 %
Acondicionadores e interos	95.49 %
TOTAL	100.00 %

Recomendaciones de Uso:


CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Banano	1 a 2 L/Ha	Aplique cada vez que se desee promover el desarrollo acelerado de la planta
Caña	1 a 2 L/Ha	Aplique cavez que se desee promover el desarrollo acelerado de la planta.
Café	1 L/Ha	Aplique para inducir la formación de flores o bien al momento del botón floral.
Melón y Sandía	0.75 a 1 L/Ha	Aplique cuando las plantas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas. Repetir al inicio de formación de guías, continúe cada 15 días después.
Flores	0.75 a 1 L/Ha	Aplique al tiempo de inicio de tuberización y repita de 15 a 30 días después.
Papa	0.75 a 1 L/Ha	Aplique a los 30 días después del trasplante y repetirlo cada 30 días después.
Tabaco	150 a 200 mL por cada 100 L de agua	Aplique a la aparición de las floraciones repitiendo 30 días después
Cítricos	150 a 200 mL por cada 100 L de agua	Aplique en puntas plateadas (manzano) y en puntas verdes (durazno) y repetir cuando el fruto tenga de 1 a 2 cm diámetro.

Modo de Acción:

Se aplica en aspersión dirigida al follaje. Aplicar temprano por la mañana o por la tarde-noche, en ausencia de viento.

Resultados de Campo:

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DEL BID-FERTILIZANTE "BIOTECH H3" EN EL CULTIVO DE PIMIENTO *Capsicum annum* L. (So/anaceae), BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO.



Altura de planta en el Estudio de evaluación de la efectividad biológica del biofertilizante **Biotech H3** en el cultivo de pimiento *Capsicum annum* L. (Solanaceae), bajo condiciones de invernadero.
Figura 1. Gráfica de Altura de planta.





Regulador de Crecimiento Líquido Enriquecido con Calcio



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

FARMAKIN[®] Ca es un producto diseñado para un aporte óptimo de Citocininas, Nitrógeno y Calcio, que fomentan la formación y diferenciación de nuevos tejidos y brotación lateral, además ejerce una función reguladora que retrasa el envejecimiento de los órganos de la planta, y alarga la vida de hojas y bulbos.

Beneficios:

* Su uso es muy recomendable durante el periodo de crecimiento vegetativo hasta el inicio de floración, favorece la formación de botones florales y el crecimiento del fruto, además de retardar la senescencia de las plantas.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% POR PESO


Citocininas	0.03 %
Nitrógeno total (N)	6.00 %
Calcio (CaO)	13.00 %
Ácidos fúlvicos	3.00 %
Materia orgánica	16.00 %

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Ajo y Cebolla	1 a 2 L/Ha	En la etapa de 6 a 8 hojas y repetir cada 15 días
Arroz	1L/Ha	Cuando la planta tenga de 2 a 3 hojas y al inicio de la panícula
Cítricos	1 a 2 L/Ha	Al inicio de la floración y repetir de 15 a 20 días después
Hortalizas de tallo hoja y flor	1.5 a 2 L/Ha	En la etapa de 6 a 8 hojas y repetir a los 15 y 21 días después
Maíz	1 L/Ha	En la etapa de 6 a 8 hojas
Hortalizas de raíz	1.5 a 2 L/Ha	En la etapa de 4 a 6 hojas y repetir en 3 ocasiones con intervalos de 15 días
Papa	1 a 2 L/Ha	A los 20 días después de la emergencia y repetir a los y días después
Piña	1 L/Ha por cada 1000 L de agua	Al inicio del crecimiento intensivo de la planta y al amarre del futuro
Banano	0.5 - 1 L/Ha	Aplicar cuando el cultivo lo demande

Resultados de Campo:

Efecto de FARMAKIN[®]Ca sobre el crecimiento vegetativo y de fruto en el tomate.



Descripción:

IMPULSSOR® es un producto de alta tecnología, diseñado para regular y estimular el crecimiento de las plantas mediante una combinación balanceada de reguladores de crecimiento, nutrientes, aminoácidos y vitaminas, todos de gran importancia en los procesos fisiológicos y en el metabolismo de las plantas. Sus componentes se encuentran en forma asimilable por las hojas y otros órganos de la planta.

Beneficios:

* Mejora significativamente la eficiencia metabólica de las plantas logrando alcanzar una excelente floración, amarre y desarrollo de frutos.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: % POR PESO

Giberelinas.....	0.05 %
Auxinas.....	0.05 %
Citocininas.....	0.02 %
Cisteína.....	0.05 %
Tiamina.....	0.11 %
Inositol.....	0.02 %
Nitrógeno total (N).....	9.00 %
Óxido de Calcio (CaO)	1.00 %
Zinc (Zn).....	2.00 %
Azufre (S).....	1.00 %
Ácidos fúlvicos.....	2.00 %

Recomendaciones de Uso:



* Disolver directamente en el tanque mezclador el contenido del sobre que acompaña a cada uno de los envases.

* Agitar bien la mezcla.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cucurbitáceas (Melón y Sandía)	1 L/Ha	Aplicar cuando las plantas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas. Repetir al inicio de floración de guías, continúe cada 15 días hasta el último corte
Flores	1.5cc - L	Aplicar al momento de la aparición de los botones florales
Maíz	1 L/Ha	Aplicar al inicio de tuberización, repetir a los 15 y 30 días
Banano	0.5 - 1 L/Ha	Aplicar cuando el cultivo lo demande
Tabaco	0.75 - 1 L/Ha	35 - 40 días después de trasplante
Papaya y Mango	0.5 - 1 L/Ha	A la floración, repetir a los 30 días

Resultados de Campo:

Efecto del IMPULSSOR® sobre el crecimiento y producción en el cultivo de tubérculos.





Regulador de Crecimiento Sólido



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

Es un producto hormonal diseñado para estimular el desarrollo de las plantas, formulado con un alto contenido de ácido giberélico y enriquecido con elementos que actúan en sinergia con esta hormona: Nitrógeno, Potasio y Zinc.

La adecuada formulación activa rápidamente el crecimiento de yemas axilares, además ayuda a superar períodos de estrés ambiental en las primeras etapas de desarrollo. La mezcla hormonal más nutrimentos permite que el efecto en la estimulación del crecimiento sea equilibrada.

La composición de sus tres ingredientes tensoactivos favorecen la dispersión de las moléculas de agua mejorando considerablemente la movilidad de ésta en el suelo y la velocidad de infiltración.


Los ácidos fúlvicos que contiene promueven la formación de agregados del suelo favoreciendo así los espacios porosos entre las partículas, mejorando en consecuencia la movilidad del agua y su disponibilidad así como la de los nutrimentos presentes en el suelo.

Beneficios:

- * Favorece el crecimiento de frutos.
- * Acelera la brotación de yemas vegetativas.
- * Estimula la floración.
- * Favorece el crecimiento de entrenudos.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno total (N).....	23.00 %
Potasio Soluble (K ₂ O).....	12.00 %
Zinc (Zn).....	10.00 %
Ácido Fúlvicos.....	1.50 %
Ácido carboxílicos.....	18.00 %
Giberelinas.....	0.20 %
Azufre (S).....	6.00 %
Materia orgánica.....	46.00 %



Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cítricos	1 kg/Ha	Aplicar al inicio de la floración y repetir de 2 a 3 veces con intervalo de 3 semanas entre cada aplicación
Sandía y Melón	0.5 - 1 Kg/Ha	Aplicar al inicio de la fructificación, repetir cada 8 días
Maíz	0.5 - 1 Kg/Ha	Aplicar en la etapa de 4 a 6 hojas desarrolladas
Papa	1 Kg/Ha	A los 20 días después de emergencia y repetir a los 20 y 40 días después
Tomate	0.5 - 1 Kg/Ha	Aplicar en la tercera y cuarta hectárea
Banano	0.5 - 1 Kg/Ha	Cuando el cultivo lo demande





Enraizador



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

PROROOT® regulador de crecimiento diseñado para inducir y estimular el crecimiento de raíces y el engrosamiento de tallos.

Su formulación se basa en una mezcla balanceada de hormonas "enraizadoras", macronutrientes y ácidos fúlvicos, los cuales son de fácil absorción y asimilación tanto por vía foliar o radical. Las auxinas (ANA y AIB) son principales hormonas exógenas que ejercen el control primario en la formación de raíces y actúan conjuntamente con cofactores del enraizamiento como Fósforo y ácidos fúlvicos para promover el desarrollo de un mayor número de raíces de excelente vigor, incrementar el "prendimiento" de plántulas en almácigos o en campo y restablecer en corto tiempo el sistema radicular en cultivos de trasplante.

Beneficios:

- * Estimula el crecimiento radicular por lo que existe mayor capacidad de asimilación de nutrientes y agua.
- * Promueve el aumento en la longitud de tallos.
- * Integra diferentes rutas de inducción (minerales, ácidos orgánicos, aminoácidos).
- * Ayuda a superar el estrés por trasplante.
- * Ayuda a la regeneración de raíces.
- * Complementa la nutrición de la planta.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno total (N).....	11.00 %
Fósforo aprovechable (PO).....	55.00 %
Ácido naftalenacético (ANA).....	0.30 %
Ácido indolbutírico (AIB).....	0.02 %
Ácido fúlvicos.....	2.00 %

Recomendaciones de Uso:



- * Disolver directamente en el tanque mezclador el contenido del sobre que acompaña a cada uno de los envases.
- * Agitar bien la mezcla.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Banano	1 Kg/Ha	Aplicar vía foliar de 3 a 4 veces por año
Almácigos y Charolas	1 gr/L de agua	Una vez por semana, iniciando las aplicaciones en la tercera semana del desarrollo de las plántulas
Trasplante	100 g por cada 200 L de agua	Aplicar al momento del trasplante, o una semana después aplicar 400g por cada 100 L de agua dirigiendo la aplicación a la base de la planta
Papaya	1 Kg/Ha	Aplicar cada 30 o 45 días
Otros cultivos	0.5 - 1 Kg/Ha	Cuando el cultivo lo demande




Resultados de Campo:

Efecto del PROROOT® sobre el crecimiento y producción del cultivo de Tomate.



	Testigo	Testigo comercial 6K/Ha	Proroot 1.5 K/Ha	Proroot 3.0 K/Ha	Proroot 4.5 K/Ha	Proroot 6.0 K/Ha
DT (mm)	6.60	8.12	6.84	7.04	9.74	11.90
PST (gr)	2.01	2.02	2.09	1.98	1.57	2.07

Efectos de PROROOT sobre el crecimiento de raíz en Tomate



	Testigo	Testigo comercial 6K/Ha	Proroot 1.5 K/Ha	Proroot 3.0 K/Ha	Proroot 4.5 K/Ha	Proroot 6.0 K/Ha
LR (cm)	37.48	44.70	38.80	37.34	38.20	45.52
NR (cm²)	78.80	77.60	72.40	99.00	80.00	114.00



Green-Max

Fertilizante Foliar Líquido

Green-Top®

Fertilizante Foliar Completo



ECUADOR



MÉXICO

Descripción:

GREEN-MAX es un fertilizante foliar líquido, constituido por elementos esenciales para el desarrollo de las plantas, contiene Tiamina (vitamina) y Cisteína (aminoácido), dos compuestos fundamentales para el metabolismo vegetal.

Modo de acción:

GREEN-MAX ha sido formulado y desarrollado para utilizarse como complemento al programa de nutrición vegetal en una amplia variedad de cultivos agrícolas como hortalizas, frutales, granos, leguminosas, ornamentales, etc. Aporta en forma balanceada los nutrientes necesarios en el metabolismo y el desarrollo vegetal.

Beneficios:

*Corrige las deficiencias nutrimentales de manera rápida y eficiente.

*Corrige requerimientos nutrimentales que no se logran cubrir con la fertilización común al suelo.

* Abastece de nutrientes a la planta que se retienen o se fijan en el suelo.

* Mejora la calidad de cosechas.

* Acelera o retarda alguna etapa fisiológica de la planta.

*Hace eficiente el aprovechamiento nutrimental de los fertilizantes.


*Corrige problemas fitopatológicos de los cultivos al aplicar Cobre y Azufre, y respaldar o reforzar la fertilización edáfica para optimizar el rendimiento de una cosecha.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno (N).....	10.00 %
Fósforo(P2O5).....	5.00 %
Potasio soluble (K2O).....	30.00 %
Azufre (S).....	2.50 %
Boro (B).....	1.00 %
Cobre (Cu).....	0.20 %
Hierro (Fe).....	0.05 %
Manganeso (Mn).....	0.25 %
Zinc (Zn).....	5.00 %
Molibdeno (Mo).....	0.01 %
Vitamina B1 (Tiamina).....	0.25 %
Cisteína.....	0.15 %

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Banano (Musapadisiaca)	0.5 - 1 L/Ha	Cuando el cultivo lo demande
Papaya (Carica papaya)	1 L/Ha	Cuando el cultivo lo demande
Mango (Mangifera indica)	1 L/Ha	Cuando el cultivo lo demande
Aguacate (Persea americana)	1 L/Ha	Cuando el cultivo lo demande
Melón (Cucumis melo)	1 L/Ha	A partir de la 4ta hoja verdadera
Sandía (Citrullus lanatus)	1 L/Ha	A partir de la 4ta hoja verdadera
Rosas (Rosa sp.)	1.5 - 2 cc/Ha	A partir de la 4ta hoja verdadera
Papa	1 L/Ha	A los 20, 40, 60 días de emergencia
APLICACIÓN FOLIAR		





Fertilizante Foliar Alto en Potasio Polvo Soluble



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

FRUTI-K® es un producto diseñado y orientado para mejorar el crecimiento, desarrollo y amarre de frutos. En frutales proporcionando mayor calibre, dureza, consistencia y capacidad para la conservación y transporte. Su formulación permite complementar la nutrición en los cultivos mencionados dada su alta y balanceada concentración de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Zinc y Boro, elementos demandados en etapas de crecimiento, desarrollo y amarre de frutos.

Modo de acción:

Fruti-K® actúa principalmente en las etapas iniciales de desarrollo, crecimiento vegetativo y amarre de fruto, impulsando la formación de tejido vascular y como activador de enzimas del metabolismo de carbohidratos y proteínas. Participa en la regulación osmótica, transpiración, producción de azúcares, resistencia a enfermedades y al estrés, lo cual lo hace un fertilizante ideal para obtener cosechas de calidad.

Beneficios:

- * Mayor estímulo nutritivo y fisiológico.
- * Mayor superficie foliar y asimilación de fotosintatos.
- * Desarrollo de hojas y tallos en mayor cantidad.
- * Mayor asimilación de nutrientes .

* Formación de tejido vascular (xilema).

* Mejor desarrollo y amarre de frutos y semillas.

* Estructura vegetal más tolerante en condiciones de estrés.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno(N).....	10.00 %
Fósforo (P2O5).....	5.00 %
Potasio soluble (k2O).....	30.00 %
Azufre (S).....	2.50 %
Boro (B).....	1.00 %
Zinc (Zn).....	5.00 %
Lignosulfato de	
sodio.....	1.90 %
Ácidos Fúlvicos.....	2.20 %

Recomendaciones de Uso:

FRUTI-K® se aplica por aspersión (aérea o terrestre), disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento de todos los órganos aéreos de la planta. Se recomienda acondicionar el agua de aplicación a un pH de 5 a 6 para mejorar la absorción del producto.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Cacao (Theobroma cacao)	1 Kg/ha en 200 L de agua	Al amarre de frutos	Foliar después del amarre y repetir los 15 días 20 y 30 días
Banano (Musa paradisiaca)	1 Kg/Ha en 6 galones de agua	Todo el año	Foliar
Papaya (Carica papaya)	2 Kg/Ha en 200 L de agua	Al amarre de frutos	Foliar después del amarre y cada 10 días hasta la cosecha
Mango (Mangifera indica)	2 Kg/Ha en 200 L de agua	Al amarre de frutos	Foliar después del amarre y cada 10 días hasta la cosecha

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones del clima y propiedades físicas y químicas del suelo”





kelatóp®

CALCIO BORO

Fertilizante Líquido



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

KELATOP® CaB es un fertilizante con una alta concentración balanceada de Calcio, Boro y enriquecido con ácidos fúlvicos. Además es un producto con formulación líquida recomendado para utilizarse principalmente en las etapas de floración y fruto en cultivos frutales y hortalizas.

Beneficios:

- * Mayor amarre de flores.
- * Favorece el crecimiento de frutos.
- * Permite reducir la presencia de pudrición apical en frutos, desorden fisiológico.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

% POR PESO

Calcio (CaO).....	8.00 %
Boro (B).....	2.00 %
Molibdeno (Mo).....	0.02 %


Recomendaciones de Uso:

Aplicar por aspersión, disuelto en suficiente agua para lograr un buen cubrimiento del follaje y de los órganos aéreos de la planta.

Puede usarse tanto en aplicaciones terrestres como aéreas.

En cultivos susceptibles a pudrición apical del fruto se recomienda hacer aplicaciones al momento de la aparición de las primeras flores, repitiendo cada 7 - 10 días hasta la etapa previa a la cosecha, logrando un buen cubrimiento de toda la planta (hojas-fruto).

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
CAFÉ	2 L/Ha	Al inicio de la floración y 15 días después
Frutales en General	2 L/Ha	En botones florales, en el desarrollo y durante el "llenado" de frutos
Maíz	1 a 2 L/Ha	A la aparición de la 6ta y 8va hoja
Banano	1 a 2 L/Ha	Todo el año, cuando el cultivo lo demande
Papaya	1 a 2 L/Ha	En antesis, al inicio de llenado del fruto, aplicar 15 días después
Tomate y Chile	1 a 2 L/Ha	Al inicio de la floración, repetir cada 15 a 21 días en cultivos forzados y bajo
APLICACIÓN FOLIAR		





Frutón^oK

Fertilizante Foliar. Alto en Potasio. Polvo soluble.

Fertilizante Foliar Alto en Potasio Polvo Soluble



ECUADOR



MÉXICO



Descripción:

FRUTÓN K es un fertilizante sólido de fórmula compleja y de alta concentración indicado para usarse en cualquier cultivo para fomentar el endurecimiento y formación de tejidos de la planta.

Beneficios:

Los componentes de este producto permiten a la planta desarrollar una estructura fuerte y bien balanceada para soportar el estrés ambiental y ofrecer una mayor resistencia al ataque de insectos y organismos fitopatógenos.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	% POR PESO
Nitrógeno Total (N)	7.00 %
Potasio Soluble (K ₂ O)	21.00 %
Calcio (CaO)	6.00 %
Azufre (S)	2.00 %
Boro (B)	0.58 %
Cobre (Cu)	2.00 %

Recomendaciones de Uso:

FRUTÓN K se aplica por aspersión, disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento de todos los órganos aéreos de la planta.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cereales	0.5 a 1 Kg/Ha	Todo el Año, cuando el cultivo lo demande
Vid	0.5 Kg/Ha	Antes de la aparición del racimo
Tomates	0.5 a 1 Kg/Ha	3 semanas después del trasplante, repetir cada 21 días hasta los últimos cortes
Papa	1 Kg/Ha	3 semanas después de la emergencia, repetir cada 21 días
Melón y Sandía	0.5 a 1 Kg/Ha	Al inicio de formación de guías, repetir 15 días hasta los últimos cortes
Banano	1 Kg/Ha	Todo el Año cuando el cultivo lo demande
APLICACIÓN FOLIAR		

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo”



Tabla de Compatibilidad

Ac	Ac
AF	C AF
Aca	C C Aca
Ak	C C C Ak
AR	C C C C AR
AMF	C C C C C AMF AminoFish
BS	C NC NC NC NC NC BS
BFM	C C C C C C BFM Bio-Film
BNP	C C C C C C NC C BNP
BTS	C C C C C C C BTS Biotech H3
BSF	C C C C C C NC C C BSF BIOMASS SF
BW	C C C C C C NC C C C BW
BX	C C C C C C C C C BX BLINDA X
CB	C3 C C C C C NC C C C C CB
CX	C C C C C C C C C C CX CINNA-Mix
EX	C C C C C C C NC C C C NC EX
EZ	C C C C C C NC C C C C EZ
FG	C C C C C C C C C C FG Farmagib
FK	C C C C C C NC C C C C C FK Farmakin
FC	C C C C C NC NC C NC C NC C NC FC
FK	C C C C C C NC C C NC NC NC C NC C C FK Fruiti-K / Frutón-K
GF	C C C C C C NC C C NC C C C C GF
GT	C C C C C C NC C C C C C C C GT Green-Max / Green-Top
IMP	C C C C C C NC C C C C C C C IMP Impulssor
CaB	C C C C C C NC C C C C C C NC CaB kelatop
FeZn	C C C C C C NC C C C C C C NC FeZn
Multi	C C C C C C NC C C C C C C NC Multi
MS	C C C C C C C C C C NC C C C C C MS MiXSAP-R
P-F	C C C C C C C C C C C C C C C P-F
Phy	C C C C C C C C NC C C C C C C C C Phy
PP	C C C C C C C C C C NC C C C C C C C PP
PRR	C C C C C C NC C C C C C C C NC NC NC NC PRR Proroot
PRB	C C C C C C NC C C C C C C C NC NC C C C PRB
SyN	C C C C C C C C C C C C C C C C C SyN
SC	C C C C C NC NC C C NC NC C C2 C NC C C NC C C SC
TK	C C C C C C NC C C C C C C C NC C C NC C C TK
VR	C C C C C C C C C C C C C C C C C VR ORGANIVIR K

- NC = No Compatible biológicamente
- NC = No Compatible
- C = Compatible
- C1 = Compatible a dosis comercial
- C3 = Compatible a pH mayor a 5
- C2 = Mala suspensabilidad




Vía a San Miguel de Putuzhí
Cuenca-Ecuador



(07) 413 84 26
asesoria.technica@fagroec.com



(+593) 099 950 00 96
(+593) 099 773 24 72



Distribuido por: